

¿A QUIÉN HAY QUE RECOMENDAR LA VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE?

POR EDAD

6 y 59 meses
60 años y > 60 años

POR FACTOR DE RIESGO y EDAD

Entre 5-59 años

Instituciones cerradas

Mayor o igual de 5 años **internas en centros de discapacidad, residencias de mayores**

CONVIVIENTES con personas de riesgo

- Trasplantados
- Insuficiencia renal crónica
- VIH con bajo recuento de CD4 (<200 cel/ μ l)
- inmunodeficiencias primarias y ciertas terapias inmunosupresoras.
- Convivientes con grupos de riesgo

POR PROFESION

- 1.- SANITARIOS Y SOCIO-SANITARIOS públicos y privados (incluido personal de oficinas de farmacia).
- 2.- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales (Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Bomberos, Servicios de protección civil.)
- 3.- Personal docente y personal de guarderías y centros de educación infantil.
6. Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.
7. Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

¿A QUIÉN HAY QUE RECOMENDAR LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID ?

POR EDAD

60 años y > 60 años

POR FACTOR DE RIESGO y EDAD

6 meses- 12 años
12-59 años

Instituciones cerradas

> o igual de 5 años
internas en centros de discapacidad, residencias de mayores

CONVIVIENTES con personas de riesgo

- Trasplantados
- IRC
- VIH con bajo recuento de CD4 (<200 cel/ μ l),
- Personas con algunas inmunodeficiencias primarias y sometidas a ciertas terapias inmunosupresoras.
- Convivientes con mayores 60, menores de 5 y con personas con factor de riesgo

POR PROFESION

1.- SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS

2.- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales : Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Bomberos, Servicios de protección civil.)

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).