

# DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA CONTRA COVID 19

Lea esta información

## Reacciones adversas poco frecuentes

Urticaria

Aumento del tamaño de ganglios

Desmayos

Dolor de cabeza persistente que no responde a medicamentos y empeora al acostarse

Dificultad para respirar

Palpitaciones y dolor en el pecho

Hinchazón importante brazo y/o piernas y/o dolor persiste

Vómitos

Hematomas en la piel

Parálisis facial

Parestesias en brazos y piernas

Alteraciones de la visión

Pueden aparecer también **otras reacciones adversas** o bien las reacciones adversas frecuentes perdurar mucho más en el tiempo y/o aumentar su intensidad.

En estos casos pueden contactar con su Centro de Salud

Para notificar efectos adversos poco frecuentes puede contactar también en:  
**924029197**



Como todos los medicamentos, pero especialmente con estas vacunas que se administrarán a una gran población en un periodo corto de tiempo, es necesario establecer mecanismos de vigilancia estrecha para poder identificar **posibles nuevas reacciones adversas**, así como aquellas que excepcionalmente pudieran aparecer de forma tardía tras la vacunación

## Reacciones adversas más frecuentes

Normalmente, las reacciones adversas más frecuentes que pueden aparecer son:

- Dolor y/o hinchazón local en la zona de inyección
- Dolor de cabeza, dolor muscular y/o de articulaciones
- Fiebre, escalofríos y malestar general
- Cansancio y fatiga

En general, todas ellas suelen ser de **intensidad leve moderada** y duración limitada en el tiempo:  
**24-48 horas**