

TRATAMIENTO EN FLORACIÓN

Uno de los momentos más susceptibles a esta enfermedad es la floración, por ello se recomienda tener protegida la plantación desde las primeras flores hasta caída de pétalos.

En el caso de meteorología favorable sería suficiente con un tratamiento en plena floración, en el caso de periodos de lluvia, realizar tratamientos cada 7 días con algunos de los productos autorizados.

Si aplicáis más de un tratamiento, intentad que tengan distinto modo de acción, con eso evitamos resistencias.



Estado F

Algunos productos autorizados

PLAGA/ ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA	DOSIS (g o cc/Hl)	MODO DE ACCIÓN
MONILIA	(1) Ciprodinil 50% WG	75	D1
	(2) Difenconazol 25% EC	20	G1
	(3) Tebuconazol 20% EW	94	
	(3) Tebuconazol 25% WG	75	
	(4) Bacillus Subtilis (Cepa Qst 713) 1,34% [SC] P/V (SERENADE ASO)	800	F6
	(5) Fenpirazamina 50% WG	120	G3

- (1) Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña
- (2) Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días
- (3) Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días
- (4) Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña con un intervalo de 5 días
- (5) Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña